


А. И. Инженер

Родные звери  
и птицы Киргизии

А. И. ЯНУШЕВИЧ

# РЕДКИЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ КИРГИЗИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЛИМ»

ФРУНЗЕ 1981

В брошюре в научно-популярной форме рассказывается о редких и исчезающих видах млекопитающих и птиц.

Описаны звери и птицы, обитающие или временно пребывающие (на пролетах и зимовках) на территории Киргизской ССР и внесенные в Красную книгу. Отмечен каждый вид, его распространение и некоторые моменты образа жизни.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, биологов, охотоведов, преподавателей школ и любителей природы.

*Утверждено к печати  
Ученым советом Института биологии и принято РИСО  
Академии наук Киргизской ССР*

Ответственный редактор Э. Д. Шукуров

Рецензенты: чл.-корр. АН Киргиз. ССР М. М. Токобаев,  
Ф. Ф. Кочетов

Причины, по которым те или иные виды животных, будь то звери и птицы, ящерицы, черепахи и змеи, рыбы и насекомые, могут быть редкими, весьма разнообразны. Иные издавна были редкими. Здесь имеют место экологические факторы: мало пригодных мест для размножения (примером может служить кулик-серпоклюв); конкуренция за пищу и убежища между собой и близкими видами заставляют селиться далеко друг от друга (крупные хищники); на границе ареала (области обитания вида) условия существования хуже, чем внутри него, в результате воспроизводство слабее, численность небольшая (в Киргизии — тетерев).

Могут быть и другие естественные экологические воздействия на численность животных. Например, эпизоотии, неурожай кормов, погодные условия — засуха, избыток осадков, заморозки, ранняя или поздняя весна, осень и т. п. — иногда приводят к тому, что животные на долгое время могут стать редкими. Но потом, при благоприятных условиях, численность их придет в норму. Изменение климата приводит к уменьшению численности одних животных и даже их вымиранию, а у других, наоборот, способствует их процветанию. Но эти явления медленные, исчисляются тысячами и миллионами лет.

Гораздо страшнее искусственное воздействие на среду обитания животных, когда под влиянием хозяйственной деятельности человека окружающая среда уничтожается или так переделывается, что становится непригодной для жизни животных. По данным метеорологов за последние 100 лет климат в Тянь-Шане не изменился, но между тем уничтожение пойменных лесов по рекам и кустарников на склонах гор, осушение болот, нерациональная, беспорядочная пастьба скота и т. п. привели к явному значительному усыханию Тянь-Шаня в целом. Мелеют реки, иссякают грунтовые воды, почва теряет влажность, возрастает почвенная эрозия, меняется состав растительного и животного населения в худшую сторону.

Такие распространенные термины, как «борьба», «наступление», «покорение» и т. п., имея в виду природу, пора заменить понятием разумного управления природой и ее использования. При современной технике «укротить» реку и вовсе ее уничтожить, вырубить лес, осушить болото не так уж сложно, как и убить тигра, медведя, слона. Но прежде чем на это решиться, надо подумать о последствиях, об их влиянии на окружающую среду, на животных, и в конечном счете, на самого человека.

Наряду с освоением новых земель, развитием животноводства, новостроек следует учитывать и необходимость сохранения природных комплексов, в которых могли бы в естественном состоянии обитать животные. Такими участками, где сохраняется весь природный комплекс, являются заповедники, но их количество ничтожно мало. В Киргизии всего два заповедника: Сары-Челекский и Иссык-Кульский. Для охраны некоторых наиболее ценных, а также редких видов создаются заказники, их тоже недостаточно, всего 15. Общая площадь заповедников и заказников составляет менее 2% от всей территории республики.

Известно, что большинство зверей и птиц, если их не трогать, легко уживаются вблизи человека. Если сохранить участки для воспроизводства животных, их численность будет увеличиваться. Такими участками могут быть заказники местного значения. Колхоз и совхоз не пострадают от того, что выделят несколько десятков гектаров охраняемых участков на «неудобных» землях— в пойме речки, лесонасаждениях, по берегам озер, на болотах и т. д. Эти места привлекут зверей и птиц, станут очагами их расселения, впоследствии такие земли можно улучшать, делать их привлекательнее для дичи.

Нельзя забывать, что нарушение естественных условий неизбежно ведет к изменению структуры животного мира. Поэтому везде, где возможно, надо стремиться сохранить участки естественной природы, особенно в местах, где животные могут размножаться.

Большими возможностями в регулировании промысла охотничьих животных, проведении биотехнических мероприятий по увеличению их запасов и улучшению мес-

тообитаний располагают охотничьи хозяйства как государственные, так и Охотрыболовсоюза. Большая часть охотугодий республики имеет охотничьи хозяйства, сеть их ежегодно увеличивается. Все это способствует сохранению редких животных.

И, наконец, есть еще одна причина, вызвавшая исчезновение редких видов. Очень часто выбивают животных до предела ради мяса, шкуры, перьев и других утилитарных целей, нередко до полного истребления вида. История знает немало тому примеров, когда целый ряд животных исчез с лица Земли. Так произошло с морской коровой, обитавшей у побережья Камчатки и Командорских островов. Через 60—70 лет после того, как обнаружили коров, они были уже полностью выбиты из-за вкусного мяса. Сравнительно недавно вымерли, вернее уничтожены, мадагаскарские страусы — птицы пятиметровой высоты, одно яйцо которых весило 9 кг. На Мадагаскаре исчез бескрылый голубь-дронт величиной с лебедя. За период с 1601 по 1644 гг. заходившие сюда моряки истребили эту птицу. Только за последние 350 лет исчезло с лица Земли более 60 видов млекопитающих, около 100 видов птиц и много видов черепах.

Можно построить город, большое водохранилище, отвести реку, вывести новую породу домашних животных, но нельзя восстановить исчезнувшие виды животных или растений — это невосвратимо. Биологи никогда не ставили вопрос о полном истреблении ни тигров ни волков и даже вредных грызунов, хотя численность их рекомендуется ограничивать. Нередко спрашивают: «Чем замечателен такой-то зверек или птица и какая от них польза?» Не всегда следует стремиться немедленно получать от животных какую-то непосредственную выгоду. Известны примеры, когда разработанные теории только через много лет находят практическое применение, до этого они представляли интерес лишь в ученых кругах. О диких животных мы знаем еще далеко не все. Совсем недавно считали, что змей как ядовитых, так и неядовитых надо убивать. Сейчас ядовитые змеи взяты под охрану государства, их яд применяется в медицине как незаменимое лекарство.

Редкие и ставшие по разным причинам малочисленными животные, кроме различного рода охранных мер, таких, как создание заповедников и парков, регулирование охотничьего промысла, проведение биотехнических мероприятий и т. п., нуждаются в особом внимании и охране. Они взяты на учет и внесены в так называемую Красную книгу редких и исчезающих животных, добывание их запрещено законом.

Некоторые редкие виды животных охраняются международными соглашениями — белый медведь, тигр, снежный барс, морж, белый журавль и целый ряд других зверей и птиц. Большое число животных (а также и растений) включено в Красную книгу СССР (61 вид млекопитающих и 63 вида птиц). Бывают животные, редкие для данной республики или местности, в других местах они могут быть и многочисленными. В этих случаях республика может дополнительно включить их в свою республиканскую Красную книгу, что и сделано в Киргизии.

Приведем список обитающих на территории республики редких и находящихся под угрозой исчезновения зверей и птиц, включенных в Красную книгу СССР. Звездочкой отмечены животные, дополнительно внесенные в Красную книгу Киргизской ССР, добывание которых запрещено лишь на территории Киргизии.

### М л е к о п и т а ю щ и е

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Складчатогуб широкоухий     | 9. Среднеазиатская выдра       |
| 2. Стрелоух белобрюхий*        | 10. Туркестанская рысь         |
| 3. Сурок Мензбира              | 11. Манул                      |
| 4. Красный волк                | 12. Снежный барс               |
| 5. Енот-полоскун*              | 13. Марал*                     |
| 6. Тянь-шаньский бурый медведь | 14. Лань европейская*          |
| 7. Перевязка                   | 15. Джейран                    |
| 8. Солонгой*                   | 16. Тянь-шаньский горный баран |
|                                | 17. Зубр                       |

## Птицы

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Розовый пеликан    | 19. Скопа             |
| 2. Кудрявый пеликан   | 20. Сапсан            |
| 3. Белая цапля*       | 21. Балобан           |
| 4. Белый аист*        | 22. Кречет            |
| 5. Черный аист        | 23. Тетерев*          |
| 6. Фламинго           | 24. Серый журавль*    |
| 7. Лебедь-шипун*      | 25. Журавль-красавка* |
| 8. Лебедь-кликун*     | 26. Дрофа             |
| 9. Казарка белолобая* | 27. Дрофа-красотка    |
| 10. Горный гусь       | 28. Стрепет           |
| 11. Савка             | 29. Саджа             |
| 12. Бородач           | 30. Рябок*            |
| 13. Снежный гриф      | 31. Кречетка          |
| 14. Беркут            | 32. Серпоклюв         |
| 15. Орлан-белохвост   | 33. Ястребиная сова*  |
| 16. Степной орел      | 34. Мохноногий сыч*   |
| 17. Орел-могильник    | 35. Красный выюрок*   |
| 18. Змееяд            |                       |


В Киргизии известно 83 вида млекопитающих и около 350 видов птиц, из них к редким и исчезающим относятся 17 видов млекопитающих и 35 видов птиц. Рассмотрим некоторые особенности их образа жизни и обитания.

## РЕДКИЕ ЗВЕРИ

### Складчатогуб широкоухий и стрелоух белобрюхий

Сравнительно крупные летучие мыши. Населяют Переднюю и Среднюю Азию, складчатогуб еще и Южную Европу и Юго-Восточный Китай. В Киргизии очень редко встречаются на юге, в приферганских районах. Обитают в пещерах и трещинах скал, иногда — на чердаках и в глиняных постройках.

Летучих мышей много видов, некоторые из них редкие, другие обычные и даже многочисленные. Во Фрун-



Белобрюхий  
стрелоух.

зе, например, маленькие летучие мыши нетопыри-карлики осенью в огромных количествах появляются на чердаках, залетают в здания, между стеклами окон и т. п., пытаются найти место для перезимовки.

Летучие мыши — весьма полезные зверьки, питаются они ночными летающими насекомыми, в большинстве случаев вредными. Селятся на чердаках домов, в дуплах деревьев, в расщелинах скал и больше всего в пещерах. Около Хайдаркана, в Араванском, Наукатском и других районах Ошской области много пещер, где живут летучие мыши и скапливаются на зимовку. Там они, прицепившись к потолку лапками, висят вниз головой и проводят всю зиму в спячке.

Нельзя не сказать без возмущения о ничем не оправданном варварском отношении к сохранению пещер. Многие пещеры изгажены, в них разводят костры, летучие мыши перебиты. Пещеры всегда вызывали особый интерес: археологи там находят остатки стоянок древнего человека, палеонтологи — ископаемых животных, кроме того, наряду с летучими мышами здесь селятся много других зверьков и птиц. Пещеры — своеобразное уникальное явление, нуждающееся в охране, сохраняя их, мы сохраним и животных, которые селятся там.

## Сурок Мензбира

Значительно мельче серого сурка, окраска серовато-рыжеватая, с темным пятном на затылке и на лопатках. Распространение его весьма ограниченное. Обитает только в Казахстане (хр. Пскемский и Угамский), Таджикистане (хр. Кураминский) и в Киргизии лишь по Чаткальскому хребту, около перевала Чапчама. Селится небольшими разрозненными колониями в альпийском поясе гор, на высоте более 3000 м над ур. м.


Сурок Мензбира впервые описан в 1925 г. известным биологом Д. Н. Кашкаровым, тогда еще отметившим его малочисленность и ограниченное распространение. Долгое время биология сурка не была изучена. Да и сейчас картина происхождения сурка Мензбира пока еще не ясна. Как и другие сурки, он питается растениями, в зимнюю спячку залегает в начале сентября и находится в ней до семи месяцев, весной, в марте—апреле, выходит из норы на поверхность.

Узкий ареал (территория, занятая данным видом) и небольшая численность указывают на то, что это исчезающий вид, сохранить его можно путем усиленной охраны.

## Красный волк

Размерами он меньше обыкновенного волка, окраска меха красновато-рыжая, хвост очень пушистый. Водится в горах Южной, Средней и Центральной Азии, по горным хребтам юга Сибири и Дальнего Востока. Всюду крайне редок, поэтому и взят под международную охрану.

Действительно, это таинственный зверь! Мало людей, которые бы видели его в природе. В крупных музеях можно увидеть его чучела, изредка красные волки содержатся в зоопарках. За последние 55 лет на базу Киргизпотребсоюза сдано в заготовки всего шесть шкурок и то это было более 25 лет тому назад. К сожалению, сотрудники научных учреждений их не видели и принадлежность шкур красному волку не подтверждена. В 1941 г. на Киргизском хребте был добыт один волк из стаи в пять особей. Шкурка хранится в зоологическом музее Московского университета.



Красный волк — таинственный зверь.

Из рассказов охотников и чабанов известно, что красные волки встречаются высоко в горах небольшими стаями в пять-шесть особей, очевидно, семьями. Охотятся преимущественно за козерогами, архарами, косялами, ловят сурков и других грызунов. Вот и все, что мы о них знаем.

### **Енот-полоскун**

Сравнительно небольшой зверек, длина его вместе с пушистым хвостом не превышает 75 см, вес—менее 15 кг. Буровато-серая с густым и пышным мехом шкурка ценится на мировых рынках.

Родина полоскуна — Центральная и Северная Америка, в СССР завезен в 1936 г. и акклиматизирован на

юге европейской части СССР и на Кавказе. В Киргизии 22 особи были выпущены в орехово-плодовые леса тоже в 1936 г., затем в 1952 г. — еще 33 зверька. Сейчас там насчитывается менее сотни голов и вряд ли численность енота-полоскуна значительно увеличится. Новый пришелец встретился здесь с неблагоприятными условиями. Несмотря на обилие корма в летнее время и достаточную вместительность охотоугодий, численность зверьков не возрастает. Это объясняется тем, что еноты выходят из зимней спячки в феврале, когда всюду лежит глубокий снег. По рыхлому снегу зверькам трудно добывать пищу и многие из них погибают.

Енот относится к хищным зверям. Питается разными грызунами, если сможет поймать — птицами, добывает лягушек, рыбу, поедает жуков, саранчу, личинок стрекоз, поденок, которых находит в речке под камнями, в пищевой рацион входят и растительные корма: орехи, яблоки, алыча, ягоды шиповника, ежевики и т. д., чем напоминает медведя, да и по повадкам сходен с ним, умеет лазать и на деревья. Полоскуном его прозвали за привычку прополоскать в воде пищу, перед тем как съесть ее.




Енот-полоскун.

## Тянь-шаньский бурый медведь

Бурые медведи, к которым относится и наш, тянь-шаньский, широко распространены в лесах Европы и Азии. Этот медведь отличается от сибирских меньшими размерами и более добродушным, даже можно сказать, трусливым нравом. Когти светлые, за что его называют белокоготным, тогда как у сибирского когти черные.

В Сибири бурый медведь живет как в горах, так и на равнинах, у нас — это типичный обитатель высокогорья. Летом спускается в пояс лесов, где находит больше корма. Перед выпадением глубоких снегов медведь залегает в спячку. Берлогу строит у верхней границы леса и в альпийском поясе, обычно среди скал. В зимнюю спячку залегает обычно в октябре-ноябре, на юге даже в декабре. В феврале-марте пробуждается и вы-



Бурый медведь — зверь всеядный.

ходит кормиться на бесснежные склоны гор. Спячка не такая глубокая, как у сурка. Медведица в середине зимы рождает одного-двух, реже — трех-четырех медвежат, очень маленьких, весом не более 500 г. Крупных детенышей самка не могла бы прокормить, так как сама в это время не кормится. В берлоге молодые питаются молоком матери, которое образуется за счет осенних жировых накоплений.

Медведь — зверь всеядный. Основную пищу составляют плоды, ягоды, корневища, луковицы и зеленые части растений, много поедает насекомых и их личинок. Непрочь поохотиться и за более крупной дичью: задавить молодого козленка, косулю, но это редко ему удается. В поселениях сурков раскапывает их норы, откуда иногда извлекает зверьков. Известный зоолог В. Н. Шнитников так описал раскопку нор: «...весь этот труд пропадает совершенно зря, и мне самому, например, известен случай, когда медведь раскопал нору на протяжении 6 метров, причем ему приходилось оттащить в сторону десятипудовые камни, должен был бросить работу, так как дальше нора уходила под огромный камень и до нее добраться было невозможно».

Особой опасности для человека и домашних животных бурий медведь не представляет. В исключительных случаях может напасть при преследовании раненый, обычно же от человека скрывается. В народной медицине, мясо, жир, желчь используются для лечебных целей, в связи с этим медведя усиленно преследуют. Чтобы окончательно не лишиться этого довольно редкого в Тянь-Шане зверя, его включили в Красную книгу.

### Перевязка

Внешностью и повадками похожа на хоря, относится к тому же семейству кунцевых, однако оригинальная окраска меха совершенно иная, чем у хоря. Зверек выглядит пестрым и каким-то игрушечным со своими растопыренными ушами и живыми движениями. По рыжевато-коричневому фону спины разбросаны ярко-рыжие и темные пятна, крупные уши и полосы под глазами белые, середина хвоста светлая, конец пушистого хвоста,



Перевязка — неутомимый истребитель грызунов

низ тела и ноги черно-бурые. Длина тела в среднем 30 см, хвоста — 20 см, вес — 500—700 г.

Населяет сухие степи и полупустыни Европы и Азии, весьма обычна в Казахстане. За исключением приферганских районов, на остальной части Киргизии чрезвычайно редка.

Неутомимый истребитель грызунов, ловит сусликов, песчанок, хомячков, мышей и полевок, иногда справляется с зайчонком, очень полезный зверек, местами исчезающий, взят под охрану по всему Советскому Союзу.

### Солонгой

За сходство с сибирским колонком его называют горным колонком, но размерами он мельче и рыжевато-желтый мех тусклее. Немного уступает в размерах и перевязке. Распространен в горах южной половины Азии, в том числе в Тянь-Шане и на юге Сибири. Везде немногочислен. Шкурка малоценная, поэтому охотники его не добывали в отличие от других пушных зверей. В Киргизии он всегда был редок, встречается лишь в восточной части республики, на самой границе своего ареала. Для сохранения солонгой внесен в республиканскую Красную книгу.

## Среднеазиатская выдра

Величиной с небольшую собаку, на низких ногах, между пальцами перепонка. Вообще выдра широко распространена по всем лесам Европы и Азии, на большей части территории промысел ее разрешен, но подвид, населяющий уголья республик Средней Азии, выделен и охраняется. Раньше в Киргизии, как и в других республиках, среднеазиатская выдра водилась по многим рекам, теперь имеются сведения о нахождении ее только в бассейне реки Тюп (Иссык-Кульская котловина) и на западе Алайской долины, возможно, в Чаткале, если ее еще там не выбили. Известно это от охотников, которые иногда добывали одну-две, хотя в заготовки шкурки не поступали.

Выдра — настоящий водный зверь. Хорошо плавает и ныряет, жилища устраивает в берегах водоемов. Питается рыбой, лягушками и другими водными животными, при случае поедает яйца и птенцов водных птиц.



Выдра.

## Туркестанская рысь

Это крупная кошка весом до 30 кг, чуть меньше снежного барса, отличается от рысей северных лесов более светлой окраской меха со слабо заметной пятнистостью. На ушах, как у всех рысей, имеются характерные кисточки.

Подобно выдре, рысь широко распространена в лесах Советского Союза, но охраняется лишь подвид — туркестанская рысь, населяющая горные леса Средней Азии.

Хищник легко справляется с косулей, молодым козрогом, тем более — с зайцем, ловит разных грызунов и птиц. В орехово-плодовых лесах были случаи нападения на акклиматизированную там лань. Учитывая малочисленность туркестанской рыси, ее включили в Красную книгу, однако в будущем численность ее придется ограничивать.

## Манул

Довольно крупная дикая кошка с массивным телом на коротких ногах. Длина тела около полуметра,




Манул.

хвост короткий, не более 24 см, мех густой и пушистый рыжевато-серой окраски, на спине и по хвосту — темные поперечные полосы.

Распространен в Центральной и Средней Азии, на юге Сибири и в Иране. У нас обитает по всем горам, от подножья до высоты 4000 м над ур. м., но всюду редок. Селится в открытых ландшафтах, по степным и опустыненным участкам. Ночной хищник, питается преимущественно грызунами и птицами. Лет 40—50 тому назад в заготовки поступало до сотни шкурок, последние годы почти не добывался.

### Снежный барс

Мало сказать, что красивый, поистине — это эффектный зверь, один из самых крупных у нас хищников.



Снежный барс.

Обитает в горах Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. Считают, что по всем этим странам живет не более одной тысячи барсов. В Киргизии встречается

всюду по хребтам Тянь-Шаня и Алая, везде редок.

О барсе много ходит легенд, как об исключительно кровожадном хищнике, который нападает на всех, кто бы ему ни встретился, никого и ничего не боится. Вопреки неправдоподобным рассказам, барс человека избегает, и увидеть его не так просто. Напасть может лишь в порядке самозащиты, раненый или попавший в капкан, но и мышь укусит, если ее схватить руками. Правда, наблюдались случаи нападения на домашний скот.

Основу питания барса составляют крупные копытные — козероги, архары, козули, а также зайцы, сурки, грызуны и птицы — все, что сможет добыть.

В заготовках пушнины барс не имел значения, добывался случайно. Шкуры, добытые охотниками, обычно остаются у местного населения. Вместе с тем его значение велико для зооэкспорта. Киргизия является главным поставщиком живых барсов для зоопарков СССР и зарубежных стран. Ежегодно их отлавливают около десятка экземпляров.

Снежный барс является одним из лучших украшений нашей фауны и ценным зверем для зоопарков, охота на него повсеместно запрещена. Поэтому барсов можно отлавливать только по особому разрешению для зооэкспорта.

## Марал

Великолепный олень, самец с красивыми ветвистыми рогами, которые он ежегодно сбрасывает, самки безрогие.

Населяет горные леса Средней Азии. Южной Сибири и Северной Монголии, на востоке до Байкала. Далее, к востоку, марала заменяет другой подвид — изюбр, а на западе — европейский олень. Когда-то они обитали по всем горам Киргизии, но были почти повсеместно выбиты ради вкусного мяса и ценных пантов.

Марал ранее населял все хвойные и орехово-плодовые леса Киргизии. Подтверждением этому служат находки сброшенных рогов оленя в разных районах республики, в том числе и по Киргизскому хребту, а также названия многих урочищ — Ур-Марал, Мин-Бугу и др. В настоя-



Марал

шее время сохранился лишь в восточной части республики (Терской и Кунгей Ала-Тоо, хр. Нарын-Тоо). Всего насчитывается не более 200 голов.

Марал во всех отношениях — ценное животное. Помимо превосходного мяса, большим спросом пользуются неороговевшие рога оленя — панты. Панты — это незатвердевшие молодые рога, заполненные кровью и сверху покрытые короткой шерстью. Позднее они у живого зверя затвердевают, кожица с шерстью сбрасывается, и они могут служить лишь украшением на стене квартиры в виде трофея охотника. Чтобы сохранить впрок, панты срезают и особым способом сушат. Из засушенных пантов изготавливают лекарство «Пантогрин», которое используется при некоторых заболеваниях.

ях. В Сибири специально разводят оленей для получения пантов, которые срезают с живых самцов, на следующий год у них вырастают новые рога.

В понижении численности марала виновен был только человек с его неудержимой алчностью. Ради вкусного мяса и ценных пантов зверя почти полностью выбили. Охота на оленей в Киргизии давно запрещена, но все же иногда браконьеры губят этих великолепных животных. Для усиления охраны и восстановления численности марал включен в республиканскую Красную книгу. Сейчас стоит вопрос о его реакклиматизации, т. е. расселении в те места, где он обитал ранее.



Лань.

## Лань европейская

Относится к оленям, по величине немного уступает маралу. В полудомашнем состоянии содержится в парках и охотничьих хозяйствах многих стран Европы. В СССР лани сохранились в лесах Литвы, Белоруссии и Украины. В Киргизию были завезены в 1962 г. восемь ланей (три самца и пять самок) и выпущены в Сары-Челекский заповедник. Рост стада проходил быстро, уже на третий год после выпуска насчитывалось семь взрослых и восемь телят, а к 1966 г. число ланей увеличилось в четыре раза. К сожалению, в последующие годы достоверных наблюдений не проводилось, известно, что ланей стало довольно много и браконьеры за ними охотятся.

## Джейран

Единственный в Киргизии вид газели. Это небольшое стройное животное, длина тела всего 100—110 см, вес до 30 кг. Спина серовато-желтая, брюхо белое, самцы с небольшими рожками.

В СССР населяет пустыни Закавказья, Среднеазиатских республик и Казахстана. В Киргизии джейран не так давно занимал значительную площадь от Боомского ущелья и на юг до Ак-Сая, водился и по северному побережью Иссык-Куля. Обладающая деликатесным мясом, эта грациозная газель усиленно преследовалась браконьерами, в результате на территории Киргизии уцелели считанные единицы. До десятка голов, возможно, сохранилось по пустынным участкам юго-западных предгорий хребта Терской Ала-Тоо, где они в прошлом водились в значительном количестве<sup>1</sup>. Второе местообитание установлено на юго-западе республики (приферганские районы), в горах Канигут, там их насчитывается два-три десятка.

---

<sup>1</sup> По данным учета 1980 г. их насчитывалось там 17 особей (Прим. ред.).



Джейран.

С каждым годом численность джейранов уменьшается. Условия для их жизни вполне благоприятны, каких-либо изменений, вызванных хозяйственной деятельностью человека, не произошло, так как джейраны обитают в полупустынных участках, поэтому, несомненно, главной причиной уменьшения их численности является браконьерство, которое до сих пор еще не изжито в результате слабо поставленной охраны.

## Тянь-шаньский горный баран

У самцов — массивные рога, у самок рога меньше, тело довольно стройное, поджарое, на сравнительно высоких ногах, очень подвижное — все это отличает диких баранов от их сородичей — домашних овец. Крупный зверь, дает до 50—70 кг чистого мяса.

Горный баран распространен в Центральной и Средней Азии и на юге Сибири. Этот подвид населяет преимущественно систему Тянь-Шаньских хребтов. Когда-то в Киргизии, особенно в долинах Ак-Сая и Арпы, да и в других местах, встречались сотенные и тысячные табуны архаров. Сейчас, по данным Госохотинспекции, едва ли наберется 6—7 тысяч особей по всей республике.

В отличие от горных козлов, которые придерживаются скалистой местности, горные бараны предпочитают ровные пологие склоны гор. Эти же места используются и для выпаса домашних животных. Однако не домашний скот вытеснил баранов, а чабаны. При каж-




Горный баран.

дом удобном случае они добывают архаров, отпугивая их от исконных местообитаний. Запрет добычи горных баранов целесообразен и своевременен, так как они уже основательно истреблены. Только после восстановления бывших запасов можно говорить о возобновлении промысла и то с ограничениями.

## Зубр

Мощный зверь, характерен огромными размерами, самцы достигают тонны веса, самки немного мельче. Эти древние животные в историческом прошлом широко населяли леса Европы, в том числе Кавказа, служили важным объектом охоты. В настоящее время во всем мире насчитывается не свыше 1500 голов, из них большая часть находится в СССР. Размещены они в Беловежской пуще (Белоруссия), в Кавказском и некоторых других заповедниках и парках.



Зубр.

Надо сказать, что восстановление зубров проходит крайне медленно: половозрелыми они становятся на четвертый-пятый года жизни, самка рождает обычно по одному теленку. Словом, зубра выбили быстрее, чем он может восстановиться.

В 1962—1964 гг. 13 зубров завезли в Киргизию и выпустили в Сары-Челекский заповедник. Из-за плохого ухода и недостаточного внимания численность зубров не увеличивается, размножаются они слабо, хотя стадо более чем наполовину обновилось за счет молодняка. Если администрация заповедника и Главохота не обеспечат должного внимания, то стадо сары-челекских зубров может полностью вымереть.

Зубры взяты под международную охрану.

## РЕДКИЕ ПТИЦЫ


### Розовый и кудрявый пеликаны

Весьма своеобразные птицы: по величине не уступают лебедю, весом до 13 кг, но выглядят неуклюжими и особенно отличаются своим громадным клювом, до полуметра длиной, под которым расположен кожистый мешок, где целиком может поместиться рыба в килограмм весом, которой и питаются пеликаны.

Обитают в Южной Европе, Передней Азии, по пустынным и степным озерам Казахстана и юга Западной Сибири. Зимуют на побережьях Каспийского и Черного морей, в Иране и Индии. В Киргизии не гнездятся, изредка встречаются на весенних и осенних пролетах в Чуйской долине.

Пеликанов добывали не из-за мяса — оно пахнет рыбой, — а ради шкурки. Если выщипать крупное перо, останется густой пух, у кудрявых — белый, у розовых — изумительно розового оттенка. Однако на свету через несколько дней он выцветает. Поделки из меха пеликанов очень ноские.

Пеликаны относятся к исчезающим видам, включены в Красную книгу СССР. Основной причиной сниже-



Кудрявый пеликан.

ния численности пеликанов, вероятно, послужило уменьшение местообитаний — озер с малодоступными берегами для хищников и человека.

Гнездятся пеликаны колониями. На низком берегу большого озера, среди тростниковых зарослей, на вытоптанной тяжелыми птицами площадке друг возле друга возвышаются гнезда в виде огромных куч беспорядочно наваленных растений. Птенцы остаются тут же, пока не вырастут. Взрослые пеликаны заняты рыбной ловлей. Если подплыть на лодке к гнездовой площадке, молодые, важно вышагивая друг за другом, уходят вглубь тростников, где и затаиваются. Пока эти беспомощные неуклюжие создания скроются, любой хищник, будь то лисица, волк или собака, легко с ними справится. Таких мест, куда трудно добраться хищникам, остается все меньше и меньше.

## Белая цапля

Очень элегантная птица. Размерами немного меньше серой цапли. Оперение снежно-белое, в полете на фоне синего неба как бы излучает серебристый свет. Всем своим строением приспособлена для жизни в болотах, длинные ноги с длинными пальцами позволяют ей бродить по мелкой воде, выискивая рыбешку или другую водную живность. А вот гнезда строит на деревьях и у самой воды.

Широко населяет субтропические и тропические области земного шара. В СССР обитает на юге европей-



Белая цапля с молодыми.


ской части, в Средней Азии, Казахстане и на Дальнем Востоке. Везде стала редкой. В Киргизии встречается на весеннем и осеннем пролетах, реже — на зимовках по незамерзающим водоемам Чуйской долины и на Иссык-Куле,

Белую цаплю безжалостно добывали из-за перьев, которые очень ценятся. В весеннем наряде на спине птиц появляются чудесные длинные распущенные перья, они служат украшением дамских шляп, как и перья страуса. Убивая цаплю весной, губили и ее потомство. Это и привело к значительному сокращению численности белых цапель.

### Белый аист

Оперение белое, крылья черные, клюв и ноги красные, вес от 3 до 4,5 кг.

Гнездится в Европе и Средней Азии. Зимует в Африке и Южной Азии. У нас сохранился в небольшом количестве и лишь на равнинах приферганских районов Ошской области. Огромные гнезда из веток можно увидеть на деревьях около поселков. Лет 50 тому назад небольшая колония белых аистов была в Чуйской долине,




Белый аист.

теперь их там не стало. Возможно, их даже не убивали, а просто вырубили крупные деревья, на которых гнездились аисты, птицы и покинули эти места.

Белый аист включен в республиканскую Красную книгу, в других республиках он обычен и охраняется населением.

### Черный аист

Обликом и поведением похож на своего собрата — белого аиста; но оперение черное с зеленым отливом, низ тела белый, клюв и ноги красные.



Черный аист.

Распространен в Европе и Азии, везде малочислен. Зимует в Африке, Индии и Китае.

Встречается по всем горам Тянь-Шаня, но везде очень редок. Питается насекомыми, лягушками, мелкой рыбой, не пропустит мышь или полевку, если случайно подвернется.

Гнездится на деревьях, в нишах скал или глинистых обрывов. Гнездо устраивает из сухих веток, лоток устилает травой, иногда использует тряпки, бумагу и другой мягкий материал, толщина гнезда бывает более

метра. Оно служит много лет, ежегодно аист его подстраивает.

Чтобы сохранить эту красивую редкую птицу, добытие ее повсеместно запрещено.

### Фламинго

Похож на цаплю, только своеобразный массивный клюв почти под прямым углом загнут, вниз. Оперение белое с розовым налётом, на шее и крыльях — ярко-розовое.

Обитает в Южной Америке, Африке, Индии, на юге Европы. Большие гнездовые колонии известны в Казахстане, где насчитывается около 50 тысяч особей. Зимуют они на южных берегах Каспийского моря, в преде-



Голова фламинго.  
Массивный загнутый  
клюв помогает добывать  
пищу.

лах СССР и в Иране. В Киргизии встречаются заметные фламинго, хотя им совсем не по пути лететь к нам, однако видели их в Чуйской долине и даже на Иссык-Куле. По наблюдениям ученых Казахстана, гнезда строят на низменных берегах озер из ила наподобие кочек, чтобы не затопила прибывающая вода. Питаются мелки-


ми водными беспозвоночными. Оригинальное устройство клюва способствует добыванию пищи со дна водоема.

В СССР фламинго взяты под охрану закона.

### Лебеди шипун и кликун

Крупные птицы весом до 13 кг и более. У взрослых оперение белое, клюв у шипуна красный, у кликуна — желтый, ноги у обоих черные. Во время плавания у шипуна шея изящно изогнутая, у кликуна прямая.

Гнездятся в Сибири, на севере Казахстана и в Европе. В Киргизии встречаются осенью, во время пролета с мест гнездовий в более теплые страны, и весной, когда возвращаются обратно. До 1500 птиц остаются на зимовку и у нас в республике. Незамерзающее озеро Иссык-Куль служит зимним пристанищем многим водоплавающим птицам, в том числе и лебедям.



Лебедь-кликун


Уже в конце октября на широких плесах озера можно увидеть большие стаи белоснежных птиц, но среди них есть и темные — это молодые текущего года. Белый наряд они получают лишь в следующем году. Отлет лебедей-зимовщиков начинается в марте, заканчивается в апреле. Если зима неблагоприятная, очень холодная,

кормовые участки покрываются льдом и трудно достать корм (харовые водоросли, рдесты и др.), исхудалые птицы задерживаются с отлетом почти на месяц. Единичные особи, сильно истощенные и подранки, остаются на Иссык-Куле на лето, но здесь они не гнездятся. Однако на Сон-Куле в последние годы две пары лебедей загнездились, но летом 1977 г. браконьеры сумели убить лебедя и несколько горных гусей прямо на гнездах, в результате и птицы, и кладки погибли.

Лебеди не относятся к редким или исчезающим видам, хотя промысел их везде запрещен, в нашей республике они включены в Красную книгу с целью сохранения на зимовке и пролетах. Без сомнения, надо приложить все усилия, чтобы сохранить гнездовья на Соч-Куле.

### **Казарка белолобая**

Гусь средней величины. Населяет тундру Северной Америки, Европы, Азии. В Сибири казарка обычная,




Казарка  
белолобая.

местами многочисленная птица, охота на нее разрешена. В Киргизии изредка пролетает через Чуйскую долину. Есть сведения, что казарок осенью видели на Ис-

сык-Куле. В Киргизии гусей всех видов очень мало, поэтому охота на них запрещена.

### Горный гусь

Сравнительно небольшой гусь, вес до 2—2,5 кг. Оперение пепельно-серое, на затылке — две резко выделяющиеся черные поперечные полосы, клюв и лапы желтые.



Горный гусь.

Обитатель высокогорных водоемов Центральной и Средней Азии (Тибет, Памир, Тянь-Шань), небольшая часть гнездится в горах Северной Монголии. Три десятилетия тому назад в Киргизии он был не так уж редок. Гнездился на озерах и реках Покровских сыртов, на высоте до 4000 м, в Алае и на некоторых других высокогорных водоемах. Основные же места обитания — озера Сон-Куль и Чатыр-Куль. Раньше на каждом из этих озер гнездилось по 150—200 пар горных гусей, теперь же на Сон-Куле насчитывается менее 30 пар, на Чатыр-Куле — 50—60 пар, в других районах гусей не стало.

Прилетают к нам горные гуси в апреле, когда озера еще не освободились ото льда. Гнездятся, как правило, колониями на берегу водоема, чаще на островках, менее доступных хищникам и особенно человеку. Кладка яиц начинается в первой половине мая, хотя гнезда со

свежими яйцами находили и в июне, — очевидно, это повторная кладка после разорения первой. Птенцы вылупляются через месяц, сутки они находятся в гнезде, а затем родители уплывают с ними в более кормные места. Первые дни взрослые, даже при опасности, стараются не покидать птенцов. Приходилось на лодке плавать вокруг выводка, фотографировать птиц на расстоянии 10—15 м, но взрослые все же не улетали, старались отплыть с молодыком в сторону. За такую доверчивую неосторожность и привязанность к детям они порой тяжело расплачиваются.



Острова на оз. Чатыр-Куль, на переднем плане гнездо горного гуся.


На зимовку гуси отлетают в октябре. Путем кольцевания выяснено, что наши гуси зимуют в Пакистане, весной и осенью пролетают через Таджикистан, на гнездовья возвращаются на те же озера. Гусей для кольцевания отлавливают сачком с моторной лодки. Взрослые в июле теряют маховые перья на крыльях,

летать не могут, к этому времени подрастают молодые и также становятся пригодны для кольцевания. За несколько последних лет было окольцовано около 1000 особей. Характерно, что только в 1958 г. мы окольцевали свыше 200 гусей, а в 1977 г. — менее двух десятков, настолько уменьшилось число птиц.

В катастрофическом уменьшении запасов горного гуся повинен прежде всего человек. Гусиные кладки разоряли весной, добывая яйца; птицы гнездились повторно, но их били все лето, не считаясь ни с насиженными яйцами, ни с птенцами, свежие яйца выбирали из гнезд.

Решением Правительства Киргизской ССР на Сон-Куле и Чатыр-Куле учреждены заказники специально для охраны этой ценной птицы. Кроме того, горный гусь внесен в Красную книгу СССР. Все же охрана горного гуся оставляет желать много лучшего, браконьеры истребляют его при каждом удобном случае. Уже в 1977 г. перебили почти половину Сон-Кульского стада.

### Савка



Интересная утка с голубым клювом. Оперение буроватое с ржавым налетом, на спине черные крапинки.

Гнездится по соседству на степных и пустынных озерах Казахстана, Западной Сибири, везде немногочисленная. Зимует в Индии, Иране, Северной Африке, на побережье Каспия. В Киргизии эта утка — редкий гость, известна только на пролетах в Чуйской долине и на Иссык-Куле.

Размерами савка значительно меньше кряквы, но, на удивление, несет яйца очень крупные: у кряквы вес яйца 45—50 г, у савки — свыше 60 г.

### **Снежный гриф.**

Огромная птица, размах крыльев достигает трех метров, вес — до 12 кг. Оперение светло-желтое, крылья и хвост черные. голова и шея покрыты светлым пухом, издали кажутся совсем голыми.

Распространен в Средиземноморье, Передней, Средней и Центральной Азии. Обитатель высоких гор, гнездится в недоступных скалах.

Несмотря на грозный вид, как и все грифы, питается падалью. Грифов называют санитарами природы. Оголенные голова и шея — очень важное приспособление для тех, кто питается падалью: копаясь во внутренностях павшего животного, они меньше пачкаются. Обычно грифы целыми днями высоко парят над горными долинами. Стоит одному заметить падаль и спуститься, как к нему быстро присоединяются другие и даже разные виды — бурый гриф и стервятник, сюда же слетаются вороны и начинается пиршество. Как же узнают соседи, где есть пожива? Все птицы обладают зорким зрением, а хищные особенно. Ближайший гриф видит, как спускается его собрат, летит туда же, за ним тянутся и другие. Не пройдет и несколько часов, как соберется до полутора десятков грифов, однако среди них — один-два снежных, остальные бурые грифы. Снежные грифы довольно редки.


### **Бородач, или ягнятник**

Крупная птица весом до 6 кг, размах крыльев — почти три метра. Голова, шея и низ тела светло-ры-

жие, спина бурая, сероватая. На подбородке удлиненные черные перья в виде бороды, из-за чего он и получил свое название — бородач.

Гнездится в горах юга Европы, Передней, Средней и Центральной Азии. В Киргизии встречается по всем горам отдельными парами. Гнездо строит в скалах, куда не всегда можно добраться человеку. Яйца, не более двух, самка откладывает очень рано, в начале марта, когда в горах всюду еще снег и холодно.

Относится бородач к грифам, хотя его зовут еще и




Снежный гриф.  
Размах крыла  
достигает  
трех метров.

ягнятником, но случаи нападения на ягнят неизвестны. В желудках добытых бородачей находили кости, причем он заглатывает даже старые выветренные кости — это его главная пища, хотя, по-видимому, не прочь закусить и падалью. Как и снежный гриф, бородач включен в Красную книгу СССР, добывание его повсеместно запрещено.

### Беркут

Самый большой орел нашей фауны. Населяет Европу, Азию и Северную Америку. В Киргизии гнездится высоко в горах повсеместно, но немногочислен. Гнезда расположены на расстоянии многих километров друг от друга.

Охота с беркутом у киргизов издавна является увле-



Бородач.



Беркут.

кательным спортом, беркут считается наиболее популярной ловчей птицей. С ним охотятся на лисицу, зайца, крупных птиц, иногда — и на молодых косуль, козорогов и волков. Прежде чем хищник станет ловчим, умелый охотник «беркутчи» затратит много времени на его выучку. Обычно берут из гнезда птенцов, а это не так просто, да и опасно. Опасность заключается не в нападении взрослых птиц — они не нападают на человека, — очень трудно не сорваться со скалы, где находится гнездо. Оно расположено в углублении (нише) высокой отвесной скалы, где-то посередине. Чтобы добраться до огромного, построенного из веток гнезда, ловец скускается с вершины скалы на веревке, его помощник держит веревку, страхует. Затем — терпеливое воспитание и обучение — и с беркутом можно охотиться.

### **Сапсан, балобан, кречет**

Как и все соколы, отличаются от других хищных птиц наличием острого зубца на нижней стороне надклювья, у остальных хищных такого зубца нет. По срав-



Охота с беркутами — увлекательный спорт.

нению со своими собратьями — пустельгой, чеглоком, дербником — немного крупнее.

Широко распространены на территории Советского Союза и за его пределами. Везде очень редки, сравнительно редкие и в Киргизии, особенно кречет и сапсан, балобан встречается чаще.

Часто говорят, что хищники губят дичь. Действительно, полезными в полном смысле слова хищных птиц назвать нельзя — мощный клюв и острые когти служат им не для украшения. Беркут нападает на охотничьих птиц и зверей, соколы питаются преимущественно птицами. Однако вред от них охотничьему хозяйству не так уж велик, во всяком случае много меньше, чем от браконье-

ров, численность которых все еще значительно превышает количество соколов. Следует их сохранять хотя бы для использования в качестве лучших ловчих птиц. Да и природа без таких эффектных птиц станет намного беднее.


В самом деле, стоит увидеть, как сокол со скоростью до 100 м в секунду настигает свою добычу — утку, голубя, галку; быстрота, сила, ловкость не превзойдены никаким другим хищником. Не менее подвижна и жертва. Хищнику далеко не всегда удастся взять добычу, в самый, казалось бы, последний момент голубь вдруг отвернет вбок и нападающий промчится мимо. Гордый сокол



Сокол-сапсан.

снова не повернет за этой же птицей, отлетит в сторону, как ни в чем не бывало.

Гнездятся соколы на деревьях, а в горах чаще всего — в нишах отвесных скал. Такое гнездо неприступно. У подножья скалы под гнездом всегда можно увидеть остатки пищи птенцов: перья и крылья галок, голубей, кекликов и других птиц, кусочки шкурки грызунов. Прежде чем давать пищу птенцам, родители клювом



Балобан.

ощипывают перья или у зверька удаляют шкурку. Кормит самка, отрывая кусочки мяса и вкладывая в рот птенцам. Самец только приносит добычу. Кормить птенцов ему самка не доверяет, так как тот, если сам голоден, может и птенца съесть. Самка всегда крупнее самца и не допустит этого.

Сапсан питается почти исключительно птицами, ловит их на лету, балобан тоже ловит птиц, но берет добычу и с земли. С прирученным балобаном охотятся на фазанов, уток, кекликов, иногда смелый хищник нападает на такую крупную птицу, как дрофа, добывает и зайцатолая.

### **Орлан-белохвост**

Крупный хищник, внешне похож на орла. Оперение темно-бурое, голова и шея светлые, хвост белый. Вес самцов до 4 кг, самок до 6—6,5 кг.

Населяет северные и умеренные части Европы и Азии, зимует на юге этих же континентов, в том числе и в Киргизии. У нас белохвост не гнездится, но зимой его нередко можно увидеть в Чуйской долине, на Иссык-Куле ежегодно зимует до десятка, иногда и более. Появляются в конце октября, улетают в апреле. На Иссык-Куль хищника привлекают зимующие там водоплавающие птицы, которых он успешно добывает. Силуэт огромного, плавно пролетающего над водой орлана наводит ужас на мирно плавающих птиц:

с шумом поднимаются на крылья утки, рассыпаются в стороны стаи лысух. Пользуясь замешательством, хищник ловко схватывает свою жертву. Парочки уток на день ему более чем достаточно, обычно удовлетворен и меньшим.



Орлан-белохвост.

### **Орлан-долгохвост**

Размерами меньше белохвоста, вес—от 2 до 3,5 кг. Спина черно-бурая, брюхо рыже-бурое, голова и шея

светлые, хвост белый с широкими черными поперечными полосами

Распространен от Каспийского моря до Байкала, на юге — до Индии. Зимует на Кавказе, в Средней Азии и Индии. В Киргизии очень редкая птица. Единичные особи, иногда пары, видели в Иссык-Кульской котловине и в верховьях Нарына, возможно, они там гнездятся.

### **Орел-могильник**


Птица черно-бурого цвета, со светлой головой и хвостом, большие крылья увеличивают ее размер, вес же невелик, всего до 3 кг.

Обитает в Южной Европе, на юге Сибири, в Монголии, Передней и Средней Азии. В Киргизии малочислен, встречается в долинах не выше 2000 м над ур. м.

Высматривая добычу — сусликов, песчанок, мышей, — любит подолгу сидеть на возвышениях, в том числе на могилах. Гнездится на деревьях.

### **Степной орел**

По окраске похож на могильника, оперение темно-бурое, на затылке — светлое рыжеватое льятно; зна-



Голова орла-могильника.

чительно крупнее могильника, вес от 3,5 до 5 кг.

Населяет южную половину Азии. В Киргизии гнезд не находили, видимо, нет подходящих степных мест и он пролетает далее к северу, в Казахстан. На весенних и осенних пролетах в Чуйской и Таласской долинах обычен. Иногда птицы пролетают группами, широко рассеянной стаей до десятка и более особей. Осенью, когда размножаются грызуны, проезжая по дороге, нередко можно увидеть на телеграфных столбах и скирдах соломы неподвижно сидящих больших орлов, высматривающих добычу.

Поедая грызунов, таких, как суслики, песчанки, тушканчики, полевки и мыши, реже — некрупных птиц, степной орел приносит немалую пользу.


### Змееед

Довольно крупных размеров, весит около 2 кг. Спина бурая, низ тела белый с рыже-бурыми пятнами. Распространен в южных частях Европы и Азии, в Африке. Зимует в Африке и Южной Азии. У нас на гнездовье найден в орехово-плодовых лесах, на пролетах встречается изредка в Чуйской долине и в Иссык-Кульской котловине.

Своеобразный хищник, питается змеями, нередко ядовитыми, и ящерицами, ими же кормит птенцов, отсюда и получил свое странное имя — змееед.

За гнездом змеееда, в котором находился пуховый птенец, однажды наблюдал наш сотрудник. Гнездо было устроено из сухих веток на дереве, на высоте 12—14 м. Родители приносили птенцу пищу один, иногда два раза в день. Поймав змею и раздробив ей голову клювом, взрослая птица заглатывает добычу, оставляя наружу лишь кончик хвоста. Прилетев, садится на край гнезда, птенец тянет за торчащий кончик, вытаскивает змею и ест ее. За 12 неполных дней наблюдений взрослые принесли птенцу трех гадюк, трех водяных ужей, шесть желтопузиков (безногих ящериц) и семь полозов.

Хотя змеееды наносят некоторый вред, губят полезных пресмыкающихся, они должны быть сохранены, так как очень редки.



Птенец змееяда.

Ученые давно доказали, что хищные птицы, за небольшим исключением, весьма полезны. В природе и особенно на культурных землях они уничтожают значительную часть вредных грызунов и насекомых. Даже несмотря на то, что некоторые хищные питаются почти исключительно охотничье-промысловыми птицами, зверями или рыбой, вред от них невелик: в большинстве случаев хищники малочисленны и поэтому заслуживают охраны, а не истребления.

Когда-то в практике охотничьих хозяйств и охотничьих обществ широко применялась выдача премий за убитых хищных птиц. Оказалось, что истребляли не столько вредных, сколько полезных. Далеко не всякий охотник может распознать луня болотного, действительно вредного в охотничьих хозяйствах, и отличить от полезных видов луней (степного, полевого и лугового) или других хищных птиц. Поэтому будет правильнее воздержаться от выстрела по любому хищнику.

### **Скопа**

Спина черновато-бурая, брюшная сторона белая, серебристая, размеры и вес почти как у змееяда.


Распространена почти по всему свету, обитает на всех

континентах: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке и в Австралии. Но всюду редкая птица. В нашей республике, например, едва ли можно насчитать более четырех—пяти гнезд. По крайней мере, известны всего три гнездящиеся пары: на Иссык-Куле, около озера Сары-Челек и в Чаткальской долине.

Селится вблизи водомов, гнездо строит на дереве, питается рыбой, хотя нырять и плавать не умеет. Пролетая над озером или рекой и увидев на поверхности рыбу (нередко до килограмма весом), схватывает ее своими мощными когтями и тут же взлетает. Светлое брюхо скопы позволяет ей незаметно налетать на рыбу и та не успевает разглядеть опасность, как попадает в лапы к хищнику.

### Ястребиная сова

Небольшая птица, величиною чуть больше галки. Сову эту называли ястребиной потому, что обликом и



Ястребиная сова — ночной хищник, обликом похожа на ястреба-тетеревятника.

пестрым оперением брюшной стороны она похожа на ястреба-тетеревятника.

Населяет леса северных частей Европы, Азии и Северной Америки, где она довольно обычная. Но в Киргизии очень редкая птица, встречается только в еловых лесах Восточного Тянь-Шаня, на западе республики ее нет. Птица полезная, питается преимущественно мелкими грызунами, ведет ночной образ жизни.

### **Мохноногий сыч**

Некрупная сова, меньше галки. Распространен примерно там же, где и ястребиная сова. У нас встречается тоже только в еловых лесах восточной части республики и очень редок.



Мохноногий сыч.

Почти все совы — весьма полезные птицы: никто столько не истребляет грызунов, как они. Таким же отменным истребителем грызунов, а также и насекомых является мохноногий сыч.

### Тетерев

Самцы по окраске резко отличаются от самок. Самец в черном с металлическим отливом оперении, с лирообразным хвостом и красными бровями выглядит таким пижоном перед скромно окрашенной рыжевато-серой самкой.

В лесной и лесостепной зонах Европы и Азии тетерев служит важным объектом охотничьего промысла. В Киргизии обитает только на востоке в горных еловых лесах. Его можно встретить в ельниках восточной половины Терской Ала-Тоо и по Кунгей Ала-Тоо. Лет сорок тому назад встречался и по Киргизскому хребту. Везде многочислен. Здесь проходит южная граница его ареала.



Тетерев

В восточную часть Тянь-Шаня тетерев попал из Сибири через Алтай еще в ледниковый период так же, как ястребиная сова, мохноногий сыч, трехпалый дятел, полевая мышь, полевка лесная, кутора — водяная землеройка—и некоторые другие птицы, млекопитающие и даже сибирская лягушка. Все эти животные европейско-сибирского происхождения интересны с научной стороны. Условия существования на границе области распространения отличаются от коренных местообитаний и это в первую очередь сказывается на их численности, она у всех небольшая. На гетерева в Киргизии специально не охотились из-за его малочисленности, тем более не охотились на ястребиную сову и мохноногого сыча. Однако за последние десятилетия замечается их отступление снова на северо-восток, уменьшается и численность. Причины этого явления пока не выяснены. Вероятно, здесь имеют место изменения условий существования, которые произошли в результате хозяйственной деятельности человека.

Чтобы сохранить нужных для науки и редких у нас тетерева, ястребиную сову и мохноногого сыча, их включили в республиканскую Красную книгу.

### Серый журавль

Всем известная большая птица серого цвета, с длинными ногами, весом более 5 кг. Особенно заметны журавли во время весеннего пролета, когда высоко в небе вереницами тянутся на север, давая знать о себе звонким курлыканьем.

Серый журавль на гнездовьях довольно обычен в Европе, Сибири, Казахстане, у нас же гнездится не более двух—трех пар в Чуйской долине. На пролетах они многочисленнее, большие стаи их можно наблюдать весной на Иссык-Куле.

Гнезда находили в Токмакском заказнике и в пойме р. Чу, около Камышановки, но в последние годы обширные болота осушили, вряд ли серый журавль теперь здесь гнездится.



Серый журавль.

### **Журавль-красавка**

Мельче серого журавля, окрашен ярче. Общий тон оперения сизовато-серый, голова, шея и зоб блестящие, черные, по бокам головы белые полосы, переходящие в пучки удлинённых перьев, которые придают птице заливчатый вид.

Распространен в Африке, на юге Европы, в Средней Азии, Казахстане. Зимует в Африке, Ираке, Иране, Индии. В пределах Киргизии отдельные пары гнездятся по берегам и на островах в Тогуз-Тороо (Нарынская область), в пойме Койсары на Иссык-Куле, в долине реки



Журавль-красавка. Пучки удлиненных перьев по бокам головы придают птице заливчатый вид.

Ат-Баши, в Чаткале, пять—шесть пар — на Сон-Куле. На пролетах более многочисленны в Таласской и Чуйской долинах, на Иссык-Куле. Весной отдельные стаи нередко насчитывают более сотни птиц. По пути они останавливаются на полях, чтобы подкормиться и отдохнуть.

В отличие от серого журавля, который гнездится на болотах, красавка выбирает сухие места вблизи озера или болота. Кладка состоит из двух яиц.

Как-то на Сон-Куле, на маленьком островке, размером 6 на 8 м, вывелась пара птенцов, тут же летали родители. Через час после нашего посещения птенцы

были перенесены взрослыми на материк, в километре от острова, где они проворно сустились у ног родителей.

## Дрофа


Самая крупная охотничья птица нашей фауны, весит до 12 кг и более. Самец в брачном наряде выглядит очень пестро, по бокам горла длинные нитевидные перья образуют «усы», которые к осени исчезают.

Область распространения их довольно широка. Обитают в Северной Африке, на юге Европы и Сибири, Передней и Средней Азии. Отдельными пятнами водятся у Байкала и на Дальнем Востоке.

Не так давно, лет 25—30 тому назад, дрофы постоянно гнездились в Иссык-Кульской котловине, в долине

р. Нарын, в Чуйской и Таласской долинах, в Приферганских районах и высоко в горах, на Арпе и Покровских сыртах. В настоящее время едва ли можно найти их гнезда в пределах республики, разве что какое-то количество гнездовий уцелело в Ошской области. В большом количестве дрофы были на пролетах и на зимовке, особенно по соседству, в Чу-Илийских горах и в Фергане. Теперь этого не стало.


Любому охотнику лестно было добыть дрофу, еще бы: столько мяса! Били птиц при каждом удобном случае, не только осенью, когда они собираются в стаи, но и весной и летом. Одновременно уничтожали и местобитания. В результате дрофа стала редкой и даже исчезающей птицей.



Дрофа. Самец в брачном наряде выглядит очень пестро.

## Дрофа-красотка

Изящная птица, действительно, красotka. Оперение дивное: золотистая голова с хохолком из черных перьев с белым основанием, длинные черные, белые и пестрые перья образуют воротник, как у заправского вельможи средних веков. Спина песчано-рыжеватая, испещренная мелким струйчатым рисунком и темными пятнами, низ тела белый. Много меньше дрофы, весит не более 2,5 кг.




Дрофа-красотка — очень изящная птица.

Распространена в Северной Африке, Аравии, Сирии, Иране, Афганистане, Монголии, в пустынях Средней Азии и Казахстана. В Киргизии — чрезвычайно редкая птица, красотки лишь иногда случайно залетают на нашу территорию.

## Стрепет

Небольшая птица весом до 800 г. Окраска оперения пестрая, сочетает темно-бурые, черные, белые и охристые цвета. Спина покрыта своеобразным темным

струйчатым рисунком, низ тела белый. В брачный период самцы темнее самок, зоб темно-коричневый, над ним — две белые полосы. К осени пестрый ошейник исчезает, спина светлеет, самцы становятся похожими на самок.



Стрепет.

долине в конце августа много птиц появлялось из Казахстана, стаи насчитывали до 100—150 особей. Держались они обычно в зарослях солодки и на люцерне. Теперь в этих местах нечасто можно увидеть стрепета, и то лишь небольшие стайки или одиночек.


Дрофа и стрепет — птицы целинных степей — когда были важными объектами охотничьего промысла, в настоящее время в связи с широким освоением целинных земель и беспорядочной охотой стали малочисленными, а на большей части ареала даже редкими. Как исчезающие виды включены в Красную книгу СССР.

### Саджа

Птица величиной с голубя. Оперение серовато-желтое. Длинные острые крылья способствуют быстрому полету.

Область гнездования простирается от юго-востока

Распространен там же, где и дрофа. Раньше стрепет, как и дрофа, гнезвился в разных местах Киргизии: на Сусамыре, в Иссык-Кульской котловине; в поймах Кара-Куджура (Нарынская область) и Кара-Дарьи (Ошская область), а также в Чуйской и Таласской долинах. Сейчас, вероятно, не найти его гнезд. Многочислен прежде был стрепет и на просторах. В Чуйской



Саджа.

Европы через степи и пустыни Казахстана и до Средней Азии, обитает также в Монголии и Синь-Цзяне. В Киргизии гнездится в каменистой пустыне, по северо-западному побережью Иссык-Куля, в районах Семизбея, по пустынным участкам поймы Нарына и Ат-Баши.

Саджа отличается особым устройством лап, которым может похвастаться не всякая птица. Ноги у нее оперены до когтей, пальцы сращены, образуя «копытце» с мозолистой подушечкой, как у верблюда. Такое приспособление облегчает передвижение по песку и камням. Наконец, своеобразная «пустынная» окраска оперения также является важным приспособлением к жизни в пустыне. Когда саджа сидит на гнезде, на совершенно открытом месте, ее трудно обнаружить, серовато-желтая окраска сливается с общим фоном пустыни. Гнездо же представляет небольшую ямку, вырытую прямо в щебнистом грунте, обычно около кустика какого-либо пустынного растения. В кладке — три, реже два яйца сероватого цвета с темными пятнами. Найти такое гнездо также не легко.

В недалеком прошлом саджа водилась в изобилии по всему ареалу. Однако как охота, так и изменение местобитаний сказались на ее численности. Сейчас она взята под защиту закона по всему Советскому Союзу.

## **Чернобрюхий рябок**

Родственен садже и такой же величины. Спина серая с желтоватыми пятнышками, брюхо черное, грудь и зоб серые, разделены черной поперечной полосой. Пальцы не сросшиеся.

Распространен рябок в пустынной местности. Обитает в Африке, Южной Европе, Казахстане, Малой и Средней Азии, Иране, Афганистане. У нас на гнездовье в небольшом количестве встречается спорадично по отдельным пустынным и полупустынным участкам в Прииссыккулье, в поймах Нарына, Ат-Баши, Кочкорки и в приферганских районах. Довольно многочислен на пролетах весной и осенью в Чуйской долине.

## **Кречетка**

Небольшой кулик. Распространен в полынных степях от юго-востока Европы, в Казахстане, до Зайсанской котловины. Зимует в северо-восточной Африке и Индии. В Киргизии не гнездится. Очень редкая на пролете птица.

## **Серпоклюв**

Довольно крупный кулик. Основной тон оперения дымчато-серый, спина несколько темнее брюха, верхняя часть головы и горло черно-бурые, поперек груди проходит черная полоса. Серпообразный клюв и ноги ярко-красные. Отличается звонким мелодичным криком. Это горная птица, эндемик Центральной Азии: обитает в Тибете, Гималаях, Памире и Тянь-Шане.

В Киргизии серпоклюв летом держится на высотах в пределах от 2000 до 3100 м над ур. м., зимой спускается ниже. Селится исключительно в широких галечниковых поймах горных рек. Таких рек не так много в Киргизии, а галечниковые поймы занимают небольшие пространства, поэтому на отдельных поймах обычно гнездятся по две—три пары, редко больше. Одним словом, не составляет большого труда пересчитать всех куликов.

Окраска серпоклюва хорошо гармонирует с местностью, где он обитает. Когда кулик затаивается среди гальки, его невозможно заметить: серая спина, темные



Серпоклю


полосы и пятна на оперении сливаются с камешками. Трудно обнаружить и его гнездо.

Впервые в Советском Союзе гнездо серпоклюва мы нашли летом 1957 г. в пойме реки Ат-Баши, там держалось две пары. Это произошло так. Группа зоологов прибыла сюда с непременным желанием найти и описать гнездо серпоклюва. Вначале заметили самку, молча уходящую от гнезда; отбежав метров триста, она остановилась, к ней откуда-то со стороны подлетел самец. Поиски гнезда в том месте, откуда ушла самка, результатов не дали. Двое из нас затаились за кустом тамариска, остальных отправились вперед. Минут через сорок увидели, как один из куликов (видимо, самка), бежит в нашу сторону, метрах в тридцати он остановился и замер. Прошло около часа. Вдруг кулик отбежал несколько шагов, отряхнулся, как курица, перед тем как садиться на яйца, присел и тут же исчез.

Покровительственная окраска птицы слилась с окружающей мелкой галькой. Разглядеть сидящего на гнезде

кулика можно было только в бинокль. Учитывая коварство серпоклюва, один из нас остался с биноклем, второй пошел к гнезду. Кулик моментально убежал. Соблюдая все предосторожности и зная точное местонахождение гнезда, мы все же с трудом отыскивали его. Гнездо демаскировали, случайно наступив на него и слегка раздавив яйцо. Вот тут-то мы и поняли, почему до нас никто не находил гнезд.

Гнездо представляло неглубокую ямку, расположенную среди гальки. Ямка выстлана мелкими неровными камешками. В гнезде было четыре, как у всех куликов, яйца грушевидной формы, цветом похожие на гальку — серые, слегка зеленоватые, с коричневыми пятнами по всей скорлупе.



Гнездо серпоклюва обнаружить очень трудно.

### **Красный выюрок**

Размерами чуть меньше скворца. В оперении самца преобладает красный цвет, самка серая.

Населяет выюрок высокогорья Центральной и Средней Азии. В Киргизии обитает несколько, хотя и не сов-



Красный выюрок.

в горах Тянь-Шаня. Располагалось оно на высоте 3300 м, в щели обрыва высокой скалы. Гнездо обнаружили, когда самка носила строительный материал. Через две недели, как и предполагали, она села насиживать яйца. Однако добраться до гнезда зоологи не смогли. Чтобы сделать описание гнезда, пришлось пригласить опытных альпинистов, которые, применив все свои приспособления, с трудом поднялись на скалу. Небольшое гнездо находилось в глубокой щели, построено было из мелких корешков и сухой травы. В гнезде лежали четыре яйца белого цвета с темными пятнышками.

Все живое в природе стремится оставить после себя как можно больше потомства. Многие рыбы, например, откладывают тысячи и даже миллионы икринок, зато заботы о потомстве, за редким исключением, почти не проявляют, тем не менее какая-то часть их выживает. Иные мало откладывают яиц или мало рожают детенышей, но обладают различными приспособлениями и повадками, что повышает выживаемость детенышей. Так и крас-

сем родственных видов выюрков с красивыми названиями: жемчужный, снежный, гималайский, красношапочный, все они обычные и даже многочисленные птички, тогда как красный выюрок чрезвычайно редок.

Исследователи изредка добывали выюрков для коллекции, но гнезд никогда не находил. Единственное в Советском Союзе и первое в мире гнездо было найдено в 1967 г. зоологами Академии наук Казахской ССР

ный выюрок — на недоступной высоте, на скалах, прячет он свое гнездо, чтобы сохранить потомство, но, несмотря на это, всюду малочислен. В чем причина, почему выюрок редок? На этот вопрос зоологи пока не могут ответить, как впрочем, и на многие другие еще загадочные явления природы.

Подавляющее большинство млекопитающих и птиц, включенных в Красную книгу, представляют немалый интерес в охотничьем промысле. Снижение их численности произошло как от изменения условий существования, так и из-за беспорядочного истребления ради шкуры, перьев и мяса. Несомненно, список редких и исчезающих животных будет пополняться и в дальнейшем. Вместе с тем по мере восстановления отдельные виды могут быть исключены из списка, введены в охотничий промысел, но с необходимыми ограничениями.

Не менее важна и другая сторона — эстетическая. Надо сохранить природу со всеми зверями и птицами ее населяющими, ибо потеря любого вида несет неисправимый ущерб.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Дементьев Д. П., Цагараев П. Т., Янушевич А. И. Промысловые звери и птицы Киргизии.—Фрунзе: Кыргызстан, 1956.
2. Млекопитающие Киргизии.—Фрунзе: Илим, 1972.
3. Птицы Киргизии. Т. I—III. Фрунзе: Илим, 1959—1961.
4. Янушевич А. И. Охрана природы — дело государственной важности.—Фрунзе: Изд-во о-ва «Знание», 1958.
5. Янушевич А. И., Тарбинский Ю. С. Животный мир Киргизии.—Фрунзе: Кыргызстан, 1968.
6. Янушевич А. И. Редкие звери и птицы Киргизии. — Фрунзе: Кыргызстан, 1972.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Редкие звери                                  | 7  |
| Складчатогуб широкоухий и стрелоух белобрюхий | 7  |
| Сурок Мензбира                                | 9  |
| Красный волк                                  | 9  |
| Енот-полоскун                                 | 10 |
| Тянь-шаньский бурый медведь                   | 12 |
| Перевязка                                     | 13 |
| Солонгой                                      | 14 |
| Среднеазиатская выдра                         | 15 |
| Туркестанская рысь                            | 16 |
| Манул                                         | 16 |
| Снежный барс                                  | 17 |
| Марал                                         | 18 |
| Лань европейская                              | 21 |
| Джейран                                       | 21 |
| Тянь-шаньский горный баран                    | 23 |
| Зубр                                          | 24 |
| Редкие птицы                                  | 25 |
| Розовый и кудрявый пеликаны                   | 25 |
| Белая цапля                                   | 27 |
| Белый аист                                    | 28 |
| Черный аист                                   | 29 |
| Фламинго                                      | 30 |
| Лебеди шипун и кликун                         | 31 |
| Казарка белолобая                             | 32 |
| Горный гусь                                   | 33 |
| Савка                                         | 35 |
| Снежный гриф                                  | 36 |
| Бородач, или ягнятник                         | 36 |
| Беркут                                        | 38 |
| Сапсан, балобан, кречет                       | 39 |
| Орлан-белохвост                               | 43 |
| Орлан-долгохвост                              | 43 |
| Орел-могильник                                | 44 |
| Степной орел                                  | 44 |
| Змея                                          | 45 |
| Скопа                                         | 46 |
| Ястребиная сова                               | 47 |
| Мохноногий сыч                                | 48 |
| Тетерев                                       | 49 |
| Серый журавль                                 | 50 |
| Журавль-красавка                              | 51 |
| Дрофа                                         | 52 |
| Дрофа-красотка                                | 54 |
| Стрепет                                       | 54 |
| Сиджа                                         | 55 |
| Чернебрюхий рябок                             | 57 |
| Кречетка                                      | 57 |
| Серноклюв                                     | 57 |
| Красный выюрок                                | 59 |
| Литература                                    | 61 |

*Александр Иванович Янушевич*

РЕДКИЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ КИРГИЗИИ

Редактор издательства *Р. И. Камарли*

Обложка художника *В. Ф. Роека*

Технический редактор *Э. К. Гаврина*

Подписано к печати 9.01.81. Д—00353. Формат бумаги 84×108 1/32. Бумага мелованная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Объем 3,28 усл. п. л., 2,9 уч.-изд. л. Тираж 2000 экз. Цена 45 коп. Заказ 196.

Издательство Академии наук Киргизской ССР  
720071, Фрунзе, Ленинский проспект, 265а

Типография Академии наук Киргизской ССР  
720001, Фрунзе, ул. Пушкина, 144

Цена 45 коп.