

И. А. Ассорина
И. П. Растеряева

лучшие сорта
ириса
гибридного
для озеленения
киргизии

ФРУНЗЕ 1983

АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

И. А. АССОРИНА, И. П. РАСТЕРЯЕВА

ЛУЧШИЕ СОРТА
ИРИСА ГИБРИДНОГО
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРГИЗИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЛИМ»
Фрунзе 1983

В брошюре изложены результаты интродукции в Ботаническом саду АН Киргизской ССР ириса гибридного. Приведена характеристика декоративных качеств, период цветения, некоторые агротехнические приемы выращивания рекомендуемых для озеленения сортов.

*Утверждено к печати
Ученым советом Ботанического сада
и принято РИСО
Академии наук Киргизской ССР*

Ответственный редактор
канд. биол. наук Л. С. Кривошеева

Рецензенты: канд. биол. наук Т. Е. Золотарев,
И. Антониади, В. Зинкевич.

Из весенних декоративных многолетников хорошо известен ирис, чаще называемый в народе петушком или касатиком. В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». Такое название дано ему за большое разнообразие окрасок цветков.

Ирис введен в культуру давно. От арабов он попал на африканское побережье Средиземного моря, в Испанию, Мексику и Калифорнию. В Европе первые сохранившиеся литературные источники об ирисе как о декоративном растении относятся к 1576—1610 гг. Во второй половине XIX в. создаются новые гибридные сорта в Германии, Франции и Англии. Большая селекционная работа проводится в США, где в последние годы получены великолепные полиплоидные формы. В Советском Союзе селекцией ирисов занимаются в Киеве, Ленинграде, Москве и некоторых других городах. Известно около 30 тысяч сортов ириса гибридного (*Iris hybrida hort.*) и более 200 видов, дико произрастающих в Европе, Северной Африке, Азии, Северной Америке.

Они хороши изящными цветками, декоративными листьями, зелеными до поздней осени, ранним цветением — в мае, когда ассортимент цветочных растений невелик. Применяются ирисы в озеленении парков и приусадебных участков. Цветки используют и на срез. Соцветия срезают утром перед роспуском первого бутона.

Ирисы высаживают группами, массивами, одиночно или в сочетании с другими многолетними цветами, кус-

тарниками на газонах, клумбах, на полянах в парках. Оригинальны композиции с естественным камнем, бассейном. Низкорослые сорта хороши на рабатках, микс-бордерах, вдоль дорожек, на альпийских горках.

Однако в цветочном оформлении городов и сел Киргизии ирис занимает недостаточное место. В настоящее время в основном распространены малоценные сорта с бледными фиолетово-пунцовыми, желтоватыми и голубоватыми окрасками. Между тем имеются сорта садового ириса с яркими и разнообразными по окраске цветками.

Ирис относится к корневищным растениям. Его корневище представляет собой разветвленные вегетативные побеги, сохраняющиеся в течение нескольких лет. Цветоносные же, или генеративные, побеги однолетние. У оснований ветвистых стеблей располагаются пучки плоских мечевидных листьев. Сорта отличаются исключительным разнообразием окрасок: насчитывается до 300 оттенков. Цветок ириса состоит из 6 долей (лепестков) околоцветника. Три из них, называемые наружными, свисают вниз, а три, в виде купола направленные вверх, — внутренними. Плод — трехгранная коробочка. Семена округлые с твердой кожистой оболочкой, от светло-коричневого до темно-бурого цвета, но образуются они не у всех сортов.

Ирис гибридный относится к группе «бородатых» ирисов, для которых характерно наличие на наружных долях околоцветника бородки из волосков.

По высоте они делятся на 3 группы: 1) низкорослые — с высотой цветоноса 25—35 см; 2) средние — 35—70 см и 3) высокие — более 70 см.

Широко распространено мнение, что ирис хорошо растет без ухода. Это не совсем верно. Малоценные сорта действительно не нуждаются в особом уходе, но вы-

сокодекоративные пышно развиваются только при хорошей агротехнике.

ПОСАДКА И УХОД

В условиях Киргизии ирис растет на открытых солнечных местах и при частичном затенении. На открытых участках он начинает цвести раньше и больше образует цветonoсных побегов, но период цветения короче. Кроме того, у некоторых сортов цветки на солнце выгорают. Для садового ириса лучше выбрать участок среди редко стоящих деревьев.

Ирис нетребователен к почвам и может расти на любых, кроме засоленных и заболоченных, но пышно развивается на легких плодородных почвах. Растения не выносят длительного застоя воды и избыточного увлажнения.

Участок под посадку готовят заранее: на 1 м² вносят 4—5 кг хорошо перепревшего навоза, 30—50 г суперфосфата и 12—20 г калийной соли.

Садовый ирис размножается делением корневища. В производственных условиях лучше сажать его в августе — сентябре, когда спадает летняя жара. Высаженные в это время растения к зиме укореняются. Посадку небольшого количества можно производить в течение всего вегетационного периода: весной, летом после цветения и осенью.

Для размножения используют хорошо развитые кусты. Их выкапывают и делят так, чтобы каждый отрезок корневища имел не менее трех почек. Старые корневища удаляют. Срезы желательно подсушить или посыпать древесным углем. Листья и корни обрезать до длины 6—10 см (рис. 1). Подготовленный таким образом посадочный материал высаживают в ямки. Если при перекопке не использовались органо-минеральные удо-




Рис. 1

брения, их можно внести в ямки перед посадкой, перемешав с землей. После этого в ямки наливают воду. Растения сажают так, чтобы над корневищем был слой земли не больше 2—3 см, так как глубокая посадка вызывает загнивание корневищ. Через несколько дней ирисы поливают. При посадке большого количества растений почву предварительно увлажняют или участок поливают сразу же после высадки. В дальнейшем до полного укоренения растений нельзя допускать иссушения почвы. Иногда куст не выкапывают целиком, а отделяют от него часть. Таким образом омолаживают посадки ириса и получают добавочный посадочный материал.

Для ускоренного размножения особо ценных сортов корневище можно делить на мелкие части с одним или двумя глазками (почками). В этом случае требуется тщательная подготовка почвы, посадочного материала и уход: срезы присыпают смесью древесного угля с серой, почки высаживают на грядки питомника в легкую питательную почву. Таким способом иногда размножают ирис зимой в оранжереях, предварительно осенью поместив маточники в подвал. Так можно из одного куста к весне получить несколько десятков молодых растений.

Наибольший декоративный эффект кусты ириса имеют на третий-четвертый год после посадки, затем их декоративность снижается. В центральной, более старой части куста, образуется все меньше цветоносных побегов. Поэтому на одном месте садовые ирисы можно оставлять без пересадки или омоложения не более трех-четырех лет.

Расстояние между растениями зависит от характера использования посадок и применяемой механизации. Для декоративного оформления их обычно высаживают

на расстоянии 30 см, при использовании на срез — расстояние между растениями в ряду 50 см и между рядами 70 см.

Ирисы отзывчивы на удобрения, особенно калийные и фосфорные. Большие дозы свежих органических удобрений вызывают загнивание корневищ. Весной, в период отрастания, вокруг растений хорошо разбросать перепревший навоз, слой не должен превышать 3 см. Суперфосфата вносят 30—50 г и хлористого калия — 20—30 г на 1 м². При отсутствии навоза используют азотные минеральные удобрения: 15—30 г на 1 м².

Второй раз ирис подкармливают перед цветением, используя все три вида удобрений.

Уход за растениями такой же, как и за другими многолетниками, — рыхление почвы, прополка, удаление отцветших соцветий и т. д. Осенью убирают с участка отмершие листья. Поливают (в зависимости от погодных условий) до цветения через 6—10, после — через 10—15 дней. От недостатка влаги садовый ирис страдает меньше, чем от ее избытка.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Ирис устойчив к вредителям и болезням, но иногда большой вред в наших условиях ему наносят луковая журчалка, пятнистости листьев и ржавчина.

Луковая журчалка (*Eumerus strigatus* Fall.) — чаще называемая нарциссовой мухой, повреждает корневище. Муха бронзово-зеленого цвета, личинки ее — грязно-желтого. Личинки проделывают ходы в корневищах, заполняя их экскрементами. Ткани загнивают из-за заражения бактериями и корневища превращаются в коричневую сгнившую массу.

Меры борьбы: глубокая заделка свежего навоза, который привлекает муху, удаление пораженных расте-

ний. Личинки уничтожают обработкой растений и почвы вокруг них 0,25—0,5%-ным раствором рогора (БИ-58), 0,2%-ным хлорофосом. Осенью почву около ирисов необходимо перекапывать, а также вносить достаточное количество фосфорных и калийных удобрений, повышающих устойчивость растений.

Гетероспориоз (*Heterosporium gracile* Sacc.) — грибковое заболевание, сильно поражающее ирис. У больных растений на листьях появляются округлые рыжевато-коричневые, затем серовато-коричневые пятна с темно-коричневой каймой. На пятнах образуется оливково-черный рыхлый налет — спороношения гриба. При сильном поражении листья буреют и засыхают. Заражение происходит и через отмершие листья. При недостатке в почве фосфора болезнь развивается более интенсивно.

Меры борьбы: тщательная уборка всех пораженных и отмерших листьев, в течение вегетации регулярное опрыскивание растений и почвы около них препаратами: 0,6—0,7%-ным раствором цинеба, 1,5—2,0%-ной суспензией ТМТД, 0,1%-ной бордосской жидкостью, 0,4—0,5%-ной хлорокисью меди.

Ржавчина (*Puccinia iridis* (D. C.) Wallr.) — грибковое заболевание, наблюдающееся на некоторых сортах и видах. На листьях пораженных растений появляются многочисленные сначала коричневые порошащие, а к осени черные бархатистые подушечки из спор. В результате листья засыхают. Зимует грибок на растительных остатках.

Меры борьбы: такие же, как при гетероспориозе. Хорошие результаты дает опрыскивание суспензией серы (0,6—0,8%-ной), а также опыливание ею же в жаркое время.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА

В Ботаническом саду испытано более 200 сортов ириса гибридного. На основании проведенных наблюдений были выявлены лучшие из них. При отборе учитывались степень устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, болезням и вредителям, сроки цветения, окраска цветков, коэффициент размножения, обилие цветения, способность давать ровный по высоте травостой, прочность цветоносов и т. п.

Приводимый ниже ассортимент не отображает всего многообразия садовых ирисов, однако он содержит ранне-, средне- и позднецветущие сорта, по возможности, представленные почти всеми окрасками. Первые цветки распускаются в конце апреля. Поздние сорта отцветают в первых числах июня. Каждый сорт ириса цветовой эффект создает в течение двух недель.

Ранние сорта. Начинают цвести с 28 апреля — 10 мая. Однако в отдельные годы, как и по другим группам, сроки цветения несколько изменяются. Особенностью ранних сортов является небольшая высота растений, средние по размеру цветки, часто неяркие окраски и бедная их гамма, меньшая декоративность. Они пригодны для цветочного оформления, бордюров, хороши в групповых посадках.

Доротея — Dorothea. Цветок средний, слабо душистый. Наружные доли околоцветника, почти горизонтально расположенные, белые с синим оттенком и сине-фиолетовыми мазками, внутренние — повисающие, бело-голубые. Высота растения и длина листьев в 40—45 см. В соцветии до 6 цветков, одновременно открыты 1—2. Цветет с 29 апреля — 8 мая.

Каприз — Caprice. Цветок средний двутонный, ароматный. Наружные доли бархатистые, фиолетово-розо-

вые, внутренние — светлее. Цветоносы прочные, высотой 50—70 см, несут 4—7 цветков, длина листьев до 45 см. Цветет с 5—16 мая. Основной тон цветка красив, но в целом декоративность соцветия снижается из-за неэффективных коричневатых оберток.

Лилипут — Liliput. Цветок мелкий, пурпурный, к краю светлее, ароматный. Высота растений 30—35 см и такая же длина листьев. Соцветие ветвистое, цветков 3. Цветет с 19—25 апреля (рис. 2).

Миддей Сан—Midday Sun. Цветок средний, одноцветный со слабым ароматом. Наружные доли слегка бархатистые, темно-фиолетовые с ярким лиловым оттенком, у внутренних оттенков слабее. Высота растений 50—55 см, длина листьев 40—45 см. Соцветие плотное из 3—4 цветков, одновременно открыты 1—3. Цветет с 25 апреля — 5 мая.

Миссис Ален Грей — Mrs. Alan Grey. Цветок средний, светло-сиреневый с приятным ароматом. Высота растений 60—70 см, длина листьев до 55 см. Соцветие плотное, из 4—6 цветков, которые открываются по одному. Цветет с 5—10 мая.

Мэрун Кейпэ—Maгоon Сарег. Цветок средний, одноцветный, темно-фиолетовый с пурпурным оттенком, очень ароматный. Наружные доли бархатистые. Высота растений 60—65 см, длина листьев до 50 см. На цветоносе 5—7 цветков, одновременно открыты 1—3. Цветет с 5—13 мая.

Сходен по окраске с сортом Миддей Сан, но имеет более интенсивный пурпуровый (красноватый) оттенок.

Флорентина Альба — Florentina Alba. Цветок средний, бледно-голубоватый с зелеными штрихами и приятным сильным ароматом. Высота растений 60—80 см, длина листьев 50—60 см, соцветие ветвистое, цветков 3—4. Цветет с 27 апреля — 10 мая.




Рис. 2

Фритьоф — Fritjof. Цветок средний, ароматный, наружные доли околоцветника фиолетово-голубые, внутренние — светло-голубые. Высота растений 60—75 см, длина листьев около 50 см. Соцветие слегка ветвится, цветков 4—5, одновременно открыты 1—2. Цветет с 27 апреля — 12 мая.

Средние сорта. Наиболее многочисленная группа, представленная сортами, зацветающими с 11—20 мая. Отличаются большей высотой и разнообразием окрасок цветков. Растения пригодны как для ландшафтного оформления, так и для срезки, поэтому ниже отмечаются только индивидуальные особенности в использовании некоторых сортов.

Альказар — Alcazar. Цветок крупный, двуцветный. Наружные доли околоцветника бархатистые, темно-фиолетовые, внутренние — светло-фиолетовые. Высота растений 80—90 см. Листья саблевидные, длинные. Цветков на соцветии 4—9, одновременно открыты — 2—3. Цветет с 14—20 мая.

Аршевек — Archeveque. Цветок средний, двуцветный, с приятным ароматом. Наружные доли околоцветника бархатистые, лиловые, внутренние — светло-лиловые. Высота растений 60—70 см, куст компактный. Длина листьев 45—50 см. Цветков на соцветии 4—6, раскрываются по одному. Цветет с 10—15 мая. Рекомендуются для озеленения.

Блу Монарх — Blue Monarch. Цветок крупный, голубой (лавандовый) с сильным нежным ароматом. Высота растений 90—105 см. Цветоносы слегка раскидистые, непрочные. Листья саблевидные, немного поникающие, длина их 60—70 см, ширина до 4—5 см. Соцветие сильно ветвистое, рыхлое, цветков 7—11, одновременно открыты 3. Нарастание куста хорошее, но образует не-




Рис. 3

большое количество генеративных побегов. Цветет с 12—20 мая. Рекомендуется для приусадебных участков.

Блу Шиммер — Blue Shimmer. Цветок очень крупный, белый с широкой каймой из голубых штрихов. Высота растений 90—100 см. Цветоносы под тяжестью цветков слегка наклоненные. Соцветие рыхлое, цветков 4—5, одновременно открыты 1—3. Среднепоздний сорт. Цветет с 15—21 мая.

Вейбаш — Wabash. Цветок средний, двуцветный, с нежным ароматом. Наружные доли околоцветника бархатистые, темно-фиолетовые с гранатовым оттенком и узкой голубоватой каймой, внутренние — белоснежные. Высота растений 85—105 см, стебли немного изогнутые. Листья широкие, поникающие, длиной до 60 см. Соцветие плотное, цветков 4—6, одновременно открыты 2—3. Нарастание куста хорошее, но образуется небольшое количество соцветий. Цветет с 10—20 мая. Рекомендуется для приусадебных участков (рис. 3).

Дайон — Dione. Цветок средний, неприятно пахнущий. Наружные доли околоцветника белые с сиреневым оттенком и фиолетовыми штрихами, внутренние — белые. Высота растений 85—90 см, длина листьев 50—60 см. Соцветие из 5—8 цветков, одновременно открыты 3—4. Цветет с 15—20 мая. Использование — посадки.

Депутат Номбло — Depute Nomblot. Цветок крупный, двуцветный, переливчатый, с сильным приятным ароматом. Наружные доли околоцветника бархатистые, карминно-фиолетовые, внутренние — дымчатые, сиренево-фиолетовые. Высота растений 90—100 см. Цветоносы слегка наклоняются под тяжестью цветков, поэтому иногда их нужно подвязывать. Листья саблевидные, широкие, длиной 60—70 см. Соцветие рыхлое, цветков 4—8, одновременно открыты 2—4, максимум 5. Цветет с 14—22 мая. Использование — срезка, приусадебные участки.




Рис. 4

Директор Пинелль—*Directeur Pinelle*. Цветок крупный, двуцветный, с нежным приятным ароматом. Наружные доли околоцветника бархатистые, вишнево-фиолетовые, внутренние—дымчатые, коричнево-сиреневые. Высота растений 90—110 см. Листья широкие, прямые, длиной до 75 см. Соцветие рыхлое, цветков 7—9, одновременно открыты 2—3. Нарастание куста среднее. Цветет с 10—18 мая (рис. 4).

Донтлисс — *Dauntless*. Цветок крупный, двуцветный, почти без аромата. Наружные доли околоцветника бархатистые, темные, красновато-вишневые, внутренние — дымчатые, сиренево-розовые. Высота растений 90—100 см. Соцветие из 5—7 цветков. Цветет 9—19 мая.

Илсан—*Ilsan*. Цветок средний, двуцветный, переличатый, слабоароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые темно-виново-красные, внутренние — дымчато-бронзовые. Высота растений 50—65 см. Соцветие плотное, из 4—5 цветков, одновременно открыты 1—2. Среднепоздний сорт. Цветет в зависимости от погодных условий с 15—18 или 20—23 мая. Использование — посадки.

Катерина — *Caterina*. Цветок мелкий, изящной формы, одноцветный, темно-голубой с нежным ароматом. Слегка выгорает на солнце. Высота растений 70—90 см. Листья прямые, ребристые, длиной 50—60 см. Цветоносы тонкие, прочные. Соцветие слегка ветвистое, короткое, плотное, цветков 3—4, одновременно цветут 1—2. Цветет с 9—20 мая. Использование — посадки.

Коронейшен—*Coronation*. Цветок средний, ярко-желтый. Цветоносы прочные, слегка ветвистые, высотой 85—90 см, несут 5—7 цветков, одновременно открыты 2. Цветет с 11—18 мая. Использование — посадки.

Лаймлайт — *Limelight*. Цветок крупный, одноцвет-

ный, золотисто-желтый с гофрированными краями. Внутренние доли в центре светлее. Высота растений 80—90 см, длина листьев до 60 см. Соцветие из 5 цветков, одновременно открыты 1—3. Нарастание куста и устойчивость к болезням средние. Цветет с 8—16 мая.

Лент А. Вильямсон — *Lent. A. Williamson*. Цветок крупный, двуцветный, переливчатый, с приятным ароматом. Наружные доли околоцветника бархатистые, голубовато-фиолетовые, внутренние — дымчатые. Высота растений 70—90 см, длина листьев 50—60 см. Цветков на соцветии 5—7. Цветет с 12—17 мая.

Либерти—*Liberty*. Цветок мелкий, слабоароматный, двутонный. Наружные доли околоцветника голубые с фиолетовым оттенком (синие), внутренние — светлее. Высота растений 50—75 см, длина листьев около 40 см. Соцветие плотное, цветков 3—4, одновременно открыты 1—2. Цветет с 10—20 мая. Использование — посадки.

Мэйзи Лоу—*Maisie Lowe*. Цветок крупный, двуцветный, слабоароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые, темные, красно-лиловые, внутренние — синие. Высота растений 75—90 см, длина листьев 70 см. Соцветие из 14 цветков, одновременно открыты 3—4. Нарастание куста среднее. Цветет с 10—18 мая.

Миссис Горейс Дарвин — *Mrs. Hogase Darwin*. Цветок мелкий, душистый, белый с фиолетово-коричневой сеткой около бородки. Высота растений 60—70, длина листьев 40—60 см. Соцветие плотное, цветков 5—9, одновременно открыты от 2 до 6. Цветет с 14—20 мая. Использование — посадки.

Ола Кала — *Ola Kala*. Цветок крупный, оранжево-желтый, ароматный. Цветоносы прочные, слегка ветвящиеся, высотой 105—110 см. Листья длиной 60—65 см. На соцветии 6—8 цветков, одновременно открыты 2—3. Цветет с 10—16 мая.

Прайд оф Доуер — *Pride of Dover*. Цветок крупный, двуцветный, ароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые красно-коричневые, внутренние — дымчатые розовато-сиреневые. Высота растений 80—90 см. Листья широкие, саблевидные, длиной 50—60 см. Соцветие среднеплотное, цветков 8—9, одновременно открыты 3. Цветет с 13—19 мая. Рекомендуются для приусадебных участков.

Рамунтчо — *Ramuntcho*. Цветок средний, двуцветный, с тонким приятным ароматом. Наружные доли бархатистые, темно-вишневые с желтой каймой, внутренние — золотисто-желтые. Высота растений 60—85 см. Соцветие состоит из 4—7 цветков, одновременно открыты 2—3. Цветет с 10—17 мая. Использование — посадки.

Рота — *Rota*. Цветок средний, двутонный, с приятным ароматом. Наружные доли околоцветника красновато-сиреневые, внутренние — розовато-сиреневые. Цветонос высотой 65—70 см, несет 5—6 цветков. Цветет с 13—16 мая. Использование — посадки.

Саус Пацифик — *South Pacific*. Цветок крупный, с тонким ароматом, голубой. Высота растений 90—100 см. Цветоносы тонкие, но прочные. Листья длиной около 60 см. Соцветие среднерыхлое, из 4 цветков, одновременно открыты 1—2. Цветет с 15—20 мая.

Сейбл — *Sable*. Цветок крупный, ароматный, почти одноцветный. Наружные доли околоцветника бархатистые, черно-фиолетовые, внутренние — темно-фиолетовые. Цветоносы высотой 80—110 см, прочные. Листья широкие, слегка изогнутые на концах, длиной до 70 см. Соцветие из 4—6 цветков, одновременно открыты 2—5. Нарастание куста слабое — на второй год после посадки образуется до 4 соцветий, 4—7 посадочных деленок. Цветет с 10—16 мая.

Сольферино — *Solferino*. Цветок средний, одноцвет-

ный, ароматный. Наружные доли околоцветника яркие, темно-сиреневые с белым центром, внутренние — светлее. Высота растений 95—100, длина листьев 50—60 см. Соцветие рыхлое, цветков 5—7, одновременно открыты 2. Цветет с 9—18 мая.

Файр Крекер — Fire Cracker. Цветок крупный, пестроокрашенный. Наружные доли вишнево-коричневые с желтым центром и вишневой полосой посередине, внутренние — светлее. Высота растений 80—95 см, длина листьев 55—60 см. Соцветие плотное, из 5—6 цветков, одновременно открыты 2. Цветет с 12—21 мая.

Фенейя — Fenaуа. Цветок крупный, нежно-ароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые, темные, голубовато-фиолетовые, внутренние — фиолетовоголубые, почти синие. Высота растений около 100 см, длина листьев — 60—70 см, соцветие из 6—10 цветков, одновременно открыты 3. Цветет с 7—19 мая.

Фро—Fго. Цветок средний, двуцветный. Наружные доли околоцветника красновато-коричневые с желтой каймой и белыми штрихами, внутренние — ярко-желтые. Высота растений 70—80 см, длина листьев 50—60 см. Цветоносы тонкие, соцветие плотное, из 8—11 цветков, одновременно открыты 2—4. Нарастание куста среднее. Цветет с 11—20 мая. Использование — посадки.

Эппо — Ерро. Цветок крупный, белый с голубоватым оттенком. Высота растений 60—70 см, длина листьев 50—60 см, соцветие плотное, из 3—5 цветков, одновременно открыты 1—3. Цветет с 7—18 мая. Использование — посадки.

Поздние сорта. Группа представлена небольшим количеством сортов, цветущих в третьей декаде мая — начале июня.

Ааресгорст — Aareshorst. Цветок средний, двуцветный, с приятным ароматом. Наружные доли околоцвет-

ника бархатистые, темные, красновато-фиолетовые, внутренние — дымчатые, розовато-сиреневые с палевой каймой. Высота растений 70—75 см, длина листьев 50—55 см. Соцветие рыхлое, из 4—6 цветков, одновременно открыты 1—2. Среднепоздний сорт. Цветет с 16—22 мая. Использование — посадки.

Аргиннис — Argynnis. Цветок средний, слабопахнущий, двуцветный. Наружные доли околоцветника бархатистые, коричнево-красные, внутренние — дымчатые, серо-желтые. Высота растений 50—85 см, длина листьев 50—60 см. Соцветие из 4—7 цветков, одновременно открыты 1—2. Среднепоздний сорт, цветет с 16—30 мая. Использование — посадки.

Гракс — Gracchus. Цветок мелкий, двуцветный, со слабым ароматом. Наружные доли околоцветника кирпично-красные, внутренние — золотисто-желтые. Высота растений 50—60 см, длина листьев около 50 см. Соцветие плотное, цветков 7—10, одновременно открыты 1—2. Среднепоздний сорт, цветет с 10—24 мая. Использование — посадки.

Монинг Сплендор — Morning Splendour. Цветок крупный, двуцветный. Наружные доли околоцветника бархатистые темно-лиловые (винно-красные), внутренние — светлее. Высота растений 80—110 см, цветоносы раскидистые. Соцветие рыхлое, из 5—8 цветков, одновременно открыты 3. Среднепоздний сорт, цветет с 18—25 мая.

Мэйен Меджик — Maan Magic. Цветок крупный, одноцветный, ароматный, гофрированный, светло-лавандово-розоватый. Высота растений около 80 см, длина листьев 50—65 см. Цветоносы толстые. Соцветие плотное, цветков 3—4, одновременно открыты 1—2. Неустойчив к болезням. Цветет с 19—25 мая.

Сноу Уайт — Snow White. Цветок крупный, чисто-белый с легким голубоватым оттенком. Высота цветоно-

сов около 1 м. Листья многочисленные, длиной 70—85 см. Соцветие слегка ветвящееся, из 5—6 цветков, одновременно открыты 2—4. Неустойчив к болезням. Цветет с 15—22 мая.

Эспада — Espada. Цветок крупный, двуцветный, ароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые, красновато-лиловые с голубой каймой, внутренние — голубовато-сиреневые с лиловыми мазками. Высота растений 65—85 см. Листья довольно узкие, длиной 50—60 см. Соцветие плотное, цветков 4—5, одновременно открыты 1—2. Нарастание куста среднее. Цветет с 18—24 мая. Использование — посадки.

ЛИТЕРАТУРА

Декоративные многолетники. Краткие итоги интродукции в Главном ботаническом саду Академии наук СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Киселев Г. Е. Цветоводство. М.: Колос, 1960.

Лещук Т. Основы агротехники ириса. Симферополь: Крымиздат, 1952.

Проценко Е. П. Краткий атлас болезней декоративных растений. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Селочник Н. Н., Добровичская И. Б. Болезни и вредители ириса. — Цветоводство, 1979, № 6.

*Ираида Александровна Ассорина,
Ирина Петровна Растерьева*

**ЛУЧШИЕ СОРТА ИРИСА ГИБРИДНОГО
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРГИЗИИ**

Редактор издательства *Е. А. Галкина*
Обложка художника *В. Ф. Роека*

ИБ № 416

Подписано к печати 28.04.83. Д—00672.

Формат бумаги 70×108¹/₃₂.

Бумага типографская № 1. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Объем 1,05 усл. п. л.
0,9 уч.-изд. л. Тираж 500 экз. Цена 15 коп.
Заказ 261.

Издательство Академии наук Киргизской ССР
720071, Фрунзе, Ленинский проспект, 265 а

Типография Академии наук Киргизской ССР
72001, Фрунзе, ул. Пушкина, 144.

сов около 1 м. Листья многочисленные, длиной 70—85 см. Соцветие слегка ветвящееся, из 5—6 цветков, одновременно открыты 2—4. Неустойчив к болезням. Цветет с 15—22 мая.

Эспада — Espada. Цветок крупный, двуцветный, ароматный. Наружные доли околоцветника бархатистые, красновато-лиловые с голубой каймой, внутренние — голубовато-сиреневые с лиловыми мазками. Высота растений 65—85 см. Листья довольно узкие, длиной 50—60 см. Соцветие плотное, цветков 4—5, одновременно открыты 1—2. Нарастание куста среднее. Цветет с 18—24 мая. Использование — посадки.

ЛИТЕРАТУРА

Декоративные многолетники. Краткие итоги интродукции в Главном ботаническом саду Академии наук СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Киселев Г. Е. Цветоводство. М.: Колос, 1960.

Лещук Т. Основы агротехники ириса. Симферополь: Крымиздат, 1952.

Проценко Е. П. Краткий атлас болезней декоративных растений. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Селочник Н. Н., Добровичская И. Б. Болезни и вредители ириса. — Цветоводство, 1979, № 6.

*Ираида Александровна Ассорина,
Ирина Петровна Растеряева*

**ЛУЧШИЕ СОРТА ИРИСА ГИБРИДНОГО
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРГИЗИИ**

Редактор издательства *Е. А. Галкина*
Обложка художника *В. Ф. Роека*

ИБ № 416

Подписано к печати 28.04.83. Д—00672.

Формат бумаги $70 \times 108^{1/32}$.

Бумага типографская № 1. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Объем 1,05 усл. п. л.
0,9 уч.-изд. л. Тираж 500 экз. Цена 15 коп.
Заказ 261.

Издательство Академии наук Киргизской ССР
720071, Фрунзе, Ленинский проспект, 265 а
Типография Академии наук Киргизской ССР
72001, Фрунзе, ул. Пушкина, 144.